CARIBE

CDD: 584.21

# HELICONIA LUCIAE Barreiros n. sp. (Heliconiaceae)

*Humberto de Souza Barreiros*[1]

*RESUMO - Examinando material de* Heliconia *do Amazonas, Brasil, pertencente ao Herbário do Museu Goeldi (MG), verifiquei que a espécie de nº 116317 MG divergia das demais helicônias conhecidas, principalmente quanto a certas características florais no que concerne, por exemplo, ao estaminódio que é linear mas dividido em duas lâminas da metade para o ápice. A planta pertence à* Secção Zingiberastrum *And. Por considerá-la nova para a ciência, denominei-a de* Heliconia luciae *Barreiros, sendo o epíteto em homenagem a minha esposa Lúcia.*

PALAVRAS-CHAVE: Heliconia nova, Amazonas.

*ABSTRACT - In this paper the author describes and figures a new species of* Heliconia *L. from Amazonas, Brazil. This species have habit* zingiberoidea *and the staminodio bilamellate.*

KEY WORDS: New *Helieonia,* Amazonas.

*Heliconia luciae* Barreiros n.sp.
Herba pumilla 60cm alta v.ultra, rhizomatosa, foliis sub cincinnis eurtopetiolatis, glabris, viridibus; lamina elliptica 18-20cm longa, 4cm lata, caudata, basi acuta. Inflorescentia erecta disticha, deltoidea, 11cm longa, cincinnoidea, aurantiaca, pedunculo viridi et longo; cincinnus (3-4), multiflorus, rachide sinuosa internodiis longis; spathis 3-4 falcatis, angustis, adscendentibus, aurantiacis, coriaceis, prima 11cm longa, alteris minoribus et proporcionalibus; braeteis interioribus 2cm longis, linearibus, carthaceis, abditis; floribus tubulosis falcatis aurantiacis, longepedicellatis; tepalis falcatis 4cm longis superne maculis atroviridis ornatis; antheris longis, rimosis; staminodio lineari ad apicem bilamellato, 1,5-1,6cm longo; ovario trigono 4-6mm longo, stylo longo, stigmate globoideo barbellato.

[1] Pesquisador em Ciências Exatas e da Natureza - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



SciELO




Figura 1 - *Heliconia luciae* Barreiros - A: hábito x2; B: flor x1; C: estaminódio x1,5.

Species *H. hirsuta* affinis, differt notis floralibus, etc.
Tipus: T. Plowman et all 121127, Brasil, Amazonas, Mun. Maraã, Rio Japurá, in sitio Cuiú-Cuiú (holotypus, MG).

Erva pequena 60cm alta ou mais, rizomatosa, folhas sob os cincinos, curtopecioladas, glabras, esverdeadas; lâmina elítica 18-20 cm longa, 4 cm larga, caudada, base aguda. Inflorescência ereta, dística, triangular, 11cm longa, cincinóidea, alaranjada, pedúnculo esverdeado e longo; cincinos 3-4, multiflorios, raque sinuosa com entrenós longos; espatas 3-4 falcadas, estreitas, ascendentes, alaranjadas, coriáceas, a primeira 11cm longa, as seguintes menores e proporcionais; bratéolas internas 2cm longas, estreitas, cartáceas, ocultas; flores tubilosas falcadas alaranjadas, longopediceladas; tépalos 4cm longos, acima com mácula verde escura; anteras longas, rimosas; estaminódio linear da metade para o ápice bilaminado, 1.5-1,8cm longo; ovário trigono 4-6mm longo, estilo longo, estígma globoideo barbelado.

AGRADECIMENTOS

Ao Museu Emílio Goeldi pelo empréstimo do material de *Heliconia L.*

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDERSSON, L. 1985. Revision of *Heliconia* subgen. *Stenochlamys Musaccae - Heliconiaceae). Op. bot.* 82: 1-123.

BARREIROS, H.S. 1976. *Heliconia Novae Americanae (Heliconiaceae)* Rodriguesia. Rio de Janeiro, 28 (41): 129-135.

BARREIROS, H.S. 1976. Variações no Limbo Foliar e no Cincino de Helicônia *(Heliconiaceae).* Rodriguesia, Rio de Janeiro, 28 (41): 199-205.

BARREIROS, H.S. 1980. Helicônias novas do norte e nordeste do Brasil *(Heliconiaceae).* Bradea. Rio de Janeiro, 3 (13): 101-104.

Recebido em 25.11.91
Aprovado em 27.04.92

Museu Paraense Emílio Goeldi
BIBLIOTECA
DO



SciELO